

مروری نظامند بر الزامات کلیدی در ارایه خدمات دندانپزشکی و حرفوابسته، در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹

چکیده

دربافت: ۱۳۹۹/۰۸/۰۵ ویرایش: ۱۳۹۹/۰۸/۱۲ پذیرش: ۱۴۰۰/۰۱/۲۳ آنلاین: ۱۴۰۰/۰۲/۰۱

زمینه و هدف: ویروس SARS-CoV-2 عامل بیماری COVID-۱۹ در شهر ووهان چین ظهور کرد و سپس به سرعت به کشورهایی چون کره جنوبی، ژاپن، ایران، ایتالیا، اسپانیا، آمریکا و سایر نقاط جهان سرایت کرد و حالت پاندمیک به خود گرفت. دندانپزشکان و حرفوابسته (از جمله پرسنل بهداشتی، درمانی، تربیاز، لابراتوارهای دندانی، مراکز رادیوگرافی و سایر پاراکلینیک‌های مرتبط)، به دلیل تماس زیاد با ترشحات بزاقی، ترشحات تنفسی و آثروسل، از جمله پرریسک‌ترین مشاغل درگیر هستند. این مطالعه با هدف گردآوری مطالب بهروز و مبتنی بر شواد علمی جهت قطع زنجیره انتقال در دندانپزشکی و حفاظت از دندانپزشک و حرفوابسته گردآوری شده است.

روش بررسی: این مطالعه با روش مرور نظامند در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ در وزارت بهداشت صورت پذیرفت. به منظور یافتن مطالعات و شواهد مرتبط، پایگاه‌های اطلاعاتی Embase، MEDLINE، PubMed، Scopus، Google Scholar و TripDatabase، WHO و CDC جهت بررسی دستورالعمل‌ها و گایدلاین‌های بهروز و مرتبط، مورد جستجو قرار گرفتند. در نهایت تعداد ۱۱۰ منبع منتخب، مورد کاوش قرار گرفتند.

یافته‌ها: بررسی مطالعات انجام شده بر روی نحوه انتقال و شیوع بیماری کووید-۱۹، نشان می‌دهد این ویروس می‌تواند به دو روش مستقیم (ترشحات بزاقی، ترشحات تنفسی و آثروسل) و غیرمستقیم (تماس با سطوح آلوده محیط و ابزارها) در محیط کاری دندانپزشکی و حرفوابسته به راحتی و به‌غور پراکنده شده و زنجیره انتقال بیماری ادامه یابد.

نتیجه‌گیری: از این رو التزام به رعایت یکسری از دستورالعمل‌ها و گایدلاین‌ها که گزیده‌ای از آنها در این تحقیق گردآوری شده است، جهت پیشگیری از ادامه زنجیره انتقال، ضروری به نظر می‌رسد.

کلمات کلیدی: کووید-۱۹، ویروس سارس، آثروسل، دندانپزشکی، زنجیره انتقال بیماری، کرونا ویروس، عفونت کرونا ویروس.

قاسم جان‌بابایی^{۱,۲}، امیر هاشم شهیدی^۳، پنجار آگری^۴، آبین حیدری‌زاده^{۵,۶}، مهدی شادنیش^{۷,۸}، قاسم صادقی^{۹,۱۰}، محسن دالبلن^{۱۱,۱۲}، امیر رضا رکن^{۱۳,۱۴}، حمید صملزاده^{۱۵,۱۶}، علی تاحریری^{۱۷,۱۸}، سعید ساعی^{۱۹,۲۰}، رضا مسائلي^{۲۱,۲۲}، غلامرضا حیدری^{۲۳,۲۴}، علی بزدانی^{۲۵,۲۶}، بهزاد هوشمند^{۲۷,۲۸}

۱- گروه همایلوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه پزشکی، ساری، ایران. ۲- گروه علمی پزشکی مازندران، ساری، ایران. ۳- گروه دندانپزشکی ترمیمی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علمی پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ۴- پژوهشکار ایندیکاتوری در سامانه، دانشگاه علوم پزشکی کوهان، کوهان، ایران. ۵- پژوهشکار علمی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ۶- گروه دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران. ۷- گروه تغذیه بالانسی و زیست درمان، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران. ۸- گروه تغذیه بالانسی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ۹- گروه زیست مواد دندانپزشکی، دانشگاه دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ۱۰- گروه پژوهشکار پرینتولوژی، دانشگاه دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران. ۱۱- دبیرخانه شورای امور علوم دندانپزشکی و تخصصی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی، تهران، ایران. ۱۲- کمیته مشورتی دندانپزشکی کرونای، معاونت درمان و وزارت بهداشت، درمان و امور علوم پزشکی، تهران، ایران. ۱۳- اداره امور دندانپزشکی، معاونت درمان و وزارت بهداشت، درمان و امور علوم پزشکی، تهران، ایران. ۱۴- اداره سلامت دهان و دندان، معاونت بهداشت وزارت بهداشت، درمان و امور علوم پزشکی، تهران، ایران. ۱۵- جامعه دندانپزشکی ایران، تهران، ایران. ۱۶- اجمن اندودانتیست های ایران، تهران، ایران. ۱۷- کمیته علمی سیاست کسوزی مدیریت بیماری کرونای، تهران، ایران. *نویسنده مسئول: تهران، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، دانشکده دندانپزشکی.

تلفن: ۰۲۱-۲۲۴۰۳۰۸۰
E-mail: behzad.houshmand.3990@gmail.com

مقدمه

کروناویریده (Coronaviridae)، از ویروس‌های پوشش‌دار، با RNA تکرشته زنجیره مثبت (+ssRNA) می‌باشد و قابلیت بیماری‌زاوی در انسان و حیوان را دارد.^{۱-۵} کروناویروس‌ها به چهار جنس (Genera)

کروناویروس‌ها (Coronaviruses) متعلق به خانواده بزرگ

رگ‌های خونی، کبد، کلیه‌ها، معده و دستگاه گوارش از جمله بافت‌هایی هستند که علاوه بر ریه‌ها، احتمال درگیری آن‌ها وجود دارد. علایم غیراختصاصی شایع به ترتیب احتمال بروز (هرچند در ترتیب دقیق آن در متابع گوناگون اتفاق نظر وجود ندارد) شامل تب، کاهش حس بویایی و یا چشایی، سرفه، خستگی، بی‌اشتهاجی، تنگی نفس و درد عضلانی می‌باشد، اگرچه سایر علایم بالینی با احتمال کمتر همچون سردرد، سرگیجه، گلوخشک، خلطخونی، آبریزش بینی، تهوع، اسهال، استفراغ و درد شکم نیز دور از انتظار نمی‌باشد.^{۲۵-۲۷}

گزارش‌هایی که تاکنون گردآوری شده‌اند، حاکی از آن است که این ویروس می‌تواند از افراد بدون علامت (Asymptomatic) و نیز آن‌هایی که هنوز علامت دار نشده‌اند (Presymptomatic) نیز منتقل شود. به نظر می‌رسد دوره نهفتگی این بیماری به طور متوسط چهار روزی پنج روز پس از مواجهه باشد و حتی در بعضی موارد تا ۱۴ روز پس از مواجهه نیز به طول بکشد. برای تشخیص کووید-۱۹، روش‌های مولکولی در صدر فهرست قرار دارند، از جمله تست‌های نوکلئیک‌اسید ویروس که روش اصلی برای تأیید بیماری در موارد مشکوک می‌باشند. نمونه‌هایی که از دستگاه‌تنفسی افراد مشکوک (شامل سواب‌های بینی و حلق، خلط و مایع لاواز برونکوآلتوئولا) تهیه می‌گردد، پس از ایزوله، به آزمایشگاه فرستاده می‌شود. روش RT-PCR (Real Time RT-PCR) از حساسیت و اختصاصیت بالایی برای تشخیص برخوردار است. همچنین دانشمندان توانسته‌اند با بهره‌گیری از الگوی ژنوم این ویروس، پرایمرها و پروب‌های اختصاصی برای تشخیص سریع‌تر طراحی کرده و بکار بزنند.^{۲۸}

در حال حاضر، معیارهای تشخیص از بیمارستان یا بازگشت به کار، شامل درجه حرارت نرمال حداقل به مدت سه روز، علایم تنفسی برطرف شده، ضایعات بهبودیافته در توموگرافی کامپیوترا قفسه‌سینه (CT) و دو نتیجه آزمایش منفی RT-PCR حداقل با یک روز فاصله می‌باشد.^{۲۹} در مطالعه‌ای که بر روی چهار بیمار مبتلا به COVID-19 که معیارهای تشخیص را داشتند انجام شد، پنج تا ۱۳ روز پس از تشخیص، تست RT-PCR مثبت بود. این یافته‌ها نشان می‌دهد که حداقل بخشی از بیماران بهبودیافته هنوز ممکن است حامل ویروس باشند. لازم‌بهذکر است که RT-PCR ماده ژنومی ویروسی را اندازه‌گیری می‌کند اما لزوماً نشان‌دهنده توابعی سرایت نیست. نتیجه

تقسیم می‌شوند: آلفا، بتا، گاما و دلتا.^۶ اولین توصیف کروناویروس‌ها در سال ۱۹۶۶ توسط Tyrell و Bynoe بود و کشت ویروس را از بیماران مبتلا به سرماخوردگی انجام دادند. تعداد هفت مورد از انواع آلفا و بتا کروناویروس‌ها قابلیت بیماری‌زایی در انسان را دارند.^{۷-۱۰} در سال‌های اخیر انواعی از بتا کروناویروس‌ها در جوامع انسانی ایجاد شده‌اند که از جمله آن به بیماری سارس (ویروس-SARS-CoV-1) در سال ۲۰۰۲ با نرخ مرگ‌ومیر ۱۰٪، بیماری مرس (ویروس-MERS-CoV) در سال ۲۰۱۲ با نرخ مرگ‌ومیر ۳۷٪ و بیماری کووید-۱۹ (توسط ویروس SARS-CoV-2) در ماه دسامبر سال ۲۰۱۹ با نرخ مرگ‌ومیر ۳٪ می‌توان اشاره نمود.^{۱۱-۱۴} علت تشابه نام ACE عامل بیماری سارس و کووید-۱۹، شباهت ژنتیکی و نیز SARS-CoV-2 از رسپتور مشترک آنها است.^{۱۵-۱۶} احتمالاً انتقال حیوانات به انسان‌ها در بازار غذاهای دریایی در ووهان، چین رخ داده است. اگرچه منشا اصلی آن همچنان در هاله‌ای از ابهام است، اما حیوان اولیه به ترتیب احتمال، مورچه‌خوار، خفاش، مار یا پنگوئن بوده است.^۷ در حال حاضر تمام جهان در ابعاد گسترده‌ای توسط سندرم (SARS-CoV-2: Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2) تنفسی حاد شدید کروناویروس دو عامل بیماری کووید-۱۹ (COVID-19: Coronavirus Disease 2019) درگیر شده‌اند. از این روز سازمان بهداشت جهانی (WHO) در تاریخ ۱۱ مارس ۲۰۲۰ (سفند ۱۳۹۸) آن را به عنوان پاندمیک اعلام نمود و در تاریخ ۲۴ آپریل ۲۰۲۰ (۵ اردیبهشت ۱۳۹۹) به عنوان بزرگ‌ترین بحران بشری پس از جنگ جهانی دوم از آن یاد نمود.^{۱۸-۲۱}

برخی بیماران ممکن است دردهای ضعیف تا شدید عضلانی، سردرد، گرفتگی یا آبریزش بینی، گلودرد یا اسهال را تجربه کنند. این علایم عموماً ملایم‌اند اما تقریباً از هر شش بیمار، یک نفر ناخوشی شدیدی را تجربه می‌کند و دچار تنگی نفس می‌شود. عامل بیماری کووید-۱۹ در دستگاه تنفسی فوقانی به طور مداوم تکثیر می‌شود و برخلاف سایر کروناویروس‌ها، شروع علایم ناگهانی نیست و این پروسه به تدریج رخ می‌دهد.^{۲۲-۲۳} افراد بالای ۶۵ سال و با بیماری مزمن زمینه‌ای نظیر بیماری‌های قلبی-عروقی، دیابت شیرین، آسم، پرفساری خون و بیماران ریوی در صورت آلوده شدن و بروز بیماری، و خامت حال شدیدتری خواهند داشت. این در حالی است که بیماری در گروه افراد کم سن و سال عموماً علایم کم‌تری دارد.^{۲۴} قلب،

و انگلیسی (ازجمله: SARS-CoV-2 COVID-19, Epidemic Laboratory Guideline Protocol Dentistry Virus Pandemic Infection Prevention, Cross-contamination Paraclinic و سایر موارد مشابه) و همه ترکیبات احتمالی انجام شد.

ورود منابع: معیار ورود منابع (طی جست‌وجوی اولیه) در این پژوهش عبارت بود از مقالات، دستورالعمل‌ها و گایدلاین‌های فارسی و انگلیسی که مرتبط با ارایه خدمات دندانپزشکی و حرف‌وابسته در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹ باشند. در جست‌وجوی اولیه تعداد ۴۱۸ مقاله، دستورالعمل و گایدلاین یافت شد. افزون‌براین، لیست منابع مقالات، دستورالعمل‌ها و گایدلاین‌های به دست آمده نیز بررسی گردید (طی جست‌وجوی تکمیلی) و منابعی که با استفاده از جست‌وجوی اولیه به دست نیامدند، شناسایی گردیدند. از این رو تعداد ۵۸ مورد مقاله با استفاده از بررسی منبع مقالات به دست آمد و مجموع مقالات، دستورالعمل‌ها و گایدلاین‌های ورودی به ۴۷۶ مورد رسید.

خروج منابع: معیار خروج منابع شامل مقالات، دستورالعمل‌ها و گایدلاین‌های منتشر شده به زبان‌هایی به جز فارسی و انگلیسی، نداشتن متن کامل و مطالعات کافی بود. حذف منابع طی سه مرحله صورت پذیرفت، در مرحله اولیه با مطالعه عنوان و چکیده، تعداد ۷۶ منبع به دلیل تکراری بودن و نداشتن متن کامل حذف گردیدند. در مرحله دوم با مطالعه عنوان، چکیده و منبع (مطالعه کلی)، تعداد ۱۹۶ منبع غیرمرتبط از مطالعه خارج شدند. در مرحله سوم، پس از مطالعه دقیق منابع باقی مانده، تعداد ۹۴ منبع به علت عدم ارتباط با ارایه خدمات دندانپزشکی و حرف‌وابسته در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹ حذف شدند. برای ارزشیابی کیفیت مقالات مورد بررسی از یک چک‌لیست معتبر استفاده گردید. کمترین و بیشترین امتیاز قابل کسب ۱ و ۱۵ و امتیاز موردقبول ۱۰ بود.^{۳۳} در نهایت، مطابق نمودار ۱ در این پژوهش تعداد ۱۱۰ مقاله، دستورالعمل و گایدلاین به روز و مرتبط با ارایه خدمات دندانپزشکی و حرف‌وابسته در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹، به عنوان منبع، مورد استفاده قرار گرفتند.

یافته‌ها

نتایج مطالعات انجام شده بر روی نحوه انتقال و شیوع بیماری کووید-۱۹ نشان می‌دهد که این ویروس به صورت مستقیم (معلق در

مثبت به معنای آن است که ویروس یک یا دو روز پیش وجود داشته است.^{۳۱۰} گرچه با بروز و گسترش کووید-۱۹ در سطح کشور، فعالیت تعداد زیادی از واحدهای صنفی و محیط‌های اداری به حالت تعطیل و یا نیمه‌تعطیل درآمد، اما فعالیت برخی از مشاغل صنعتی (جهت تامین مایحتاج مردم) و برخی از مشاغل خدماتی (برای ارایه خدمات ضروری)، در این شرایط اجتناب ناپذیر است. دندانپزشکان و حرف‌وابسته (ازجمله پرسنل بهداشتی، درمانی، تربیت، لابراتوارهای دندانی، مراکز رادیوگرافی و سایر پاراکلینیک‌های مرتبط)، به دلیل تماس زیاد با ترشحات بزاقی، ترشحات تنفسی و آتروسل، ازجمله پرریسک‌ترین مشاغل درگیر هستند.

بدیهی است برای پیشگیری از ابتلا به کووید-۱۹ به عنوان یکی از عوامل زیستی پرخطر، مدیریت شیوع این بیماری در محیط کار و رعایت اصول بهداشت شغلی ویژه این بیماری، در حفظ سلامت دندانپزشکان، حرف‌وابسته و نیز خانواده‌های آنها، از اهمیت بسیاری برخوردار می‌باشد.^{۳۳}

هدف از این تحقیق، گردآوری مطالب به روز و مبتنی بر شواد علمی در راستای این مهم می‌باشد که باید از طریق قطع زنجیره انتقال این ویروس صورت پذیرد.


روش بررسی

این مطالعه با روش مرور نظامند در بازه زمانی بهمن ۱۳۹۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۹ صورت پذیرفت. به منظور دستیابی به مستندات و شواهد علمی مرتبط با ارایه خدمات دندانپزشکی و حرف‌وابسته در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹، مقالات منتشر شده در پایگاه‌های خارجی مانند پایگاه‌های اطلاعاتی Embase، MEDLINE، PubMed و سایر پایگاه‌های مرتبط TripDatabase، Google Scholar، Scopus مورد جست‌وجو قرار گرفتند.

همچنین جهت تکمیل نتایج، وبسایتهاي WHO و CDC جهت بررسی دستورالعمل‌ها و گایدلاین‌های به روز و مرتبط، استفاده گردید. جستجوی مقالات با استفاده از جست‌وجوی نظامند با کلیدواژه‌های فارسی (ازجمله: کووید-۱۹، کروناویروس، اپیدمی، پاندمی، همه‌گیری، دندانپزشکی، دستورالعمل، گایدلاین، لابراتوار دندانی، پاراکلینیک، زنجیره انتقال، کترول عفونت و سایر موارد مشابه)

۱- راههای انتقال کرونایروس: سه راه اصلی انتقال این ویروس به صورت کلی در محیط مراکز دندانپزشکی و حرفوابسته، مطابق شکل شماره یک وجود دارد: ۱- انتقال از طریق ویروس‌های معلق در هوا، ۲- حین مداخلات دندانپزشکی و ۳- تماس بیمار با سطوح و ابزارها. حین مداخلات دندانپزشکی (حالت دوم انتقال)، انتقال از سه طریق صورت می‌پذیرد: دراپلت بزاقی (A)، دراپلت تنفسی (B) و آثروسل (C). از حالت A به سمت حالت C، فاصله انتقال افزایش آثروسل (Droplet) و آثروسل (SARS-CoV-2) حین مداخلات دندانپزشکی محسوب می‌شود:

۱- احتمال تولید و فرکانس تولید آثروسل در مداخلات دندانپزشکی بسیار بالاست و بهوفور حین کار تولید می‌شود، ۲- آثروسل عفونی حامل ویروس (بر خلاف سه روش دیگر)، به علت سایز بسیار کوچک به مدت بسیار طولانی (طبق برخی تحقیقات به مدت سه ساعت) می‌تواند در فضای معلق بماند، ۳- آثروسل حاوی ویروس بر خلاف سه روش دیگر، به علت سایز بسیار کوچک اگر وارد ریه فرد سالم گردد، می‌تواند تا انتهایی ترین پایانهای برش پیش رود و ویروس را منتقل نماید. ۴- آثروسل عفونی حامل ویروس تا فاصله حدود ۵ m می‌تواند منتقل شود اما سایر روش‌ها، حداقل برد یک الی نهایتاً ۲ m را دارند.^{۲۵-۲۸}



نمودار ۱: روند بررسی پایگاه‌های اطلاعاتی و مراحل ورود و خروج منابع (منابع شامل مقالات، دستورالعمل‌ها و گایدلاين‌های منتشر شده می‌شود).

در اپلت (Droplet) و آثروسل (Droplet) و غیرمستقیم (تماس با سطوح) می‌تواند به راحتی در محیط مراکز دندانپزشکی و حرفوابسته پراکنده شده و سبب ایجاد بیماری گردد.^{۲۴} از این‌رو رعایت یکسری دستورالعمل‌های بهداشت شغلی و کنترل عفونت جهت کاهش پراکنگی ویروس در محیط‌های درمانی، بهویژه مطب‌ها و کلینیک‌های دندانپزشکی الزامی می‌باشد. در مبحث یافته‌های این مقاله سعی شده است با گردآوری مطالب متنوع از مقالات، دستورالعمل‌ها و گایدلاين‌های مرتبه با ارایه خدمات دندانپزشکی و حرفوابسته، که مورد توافق اکثر مراجع علمی مورد اعتماد دندانپزشکی هستند، مجموعه‌ای مبتنی بر شواهد در هشت بخش حاوی اطلاعات علمی و بالینی کاربردی در اختیار جامعه دندانپزشکی کشور و حرفوابسته، قرار داده شود.



شکل ۱: راههای انتقال و راههای پیشگیری از انتقال کرونایروس به صورت کلی در محیط مراکز دندانپزشکی و حرفوابسته.

حفظت شخصی دندانپزشک و پرسنل درمانی (دستیار) برای انجام هرگونه مداخله دندانپزشکی برای بیماران باید طبق اصول زیر صورت پذیرد: ۱- ترتیب پوشیدن تجهیزات حفاظت‌شخصی: شست‌وشوی دست‌ها، گان، ماسک، عینک، شیلد، کلاه، دستکش، ۲- ترتیب درآوردن تجهیزات حفاظت‌شخصی: دستکش شسته اما خارج نمی‌شود، کلاه، گان، شیلد، عینک، ماسک، دستکش، شست‌وشوی دست‌ها، ۳- استفاده از ماسک N95 جهت جلوگیری از ورود آئروسل‌های عفونی به سیستم تنفسی، ۴- ماسک مورد استفاده باید پس از اتمام شیفت (در نهایت هشت ساعت برای ماسک‌های N-95^{۵۵-۵۷}) و چهار ساعت برای ماسک‌های ساده جراحی) تعویض گردد. ۵- استفاده الزامی از عینک ایزوله یا شیلد ایزوله جهت حفاظت از چشم که الزاماً باید روی چشم (جهت جلوگیری از ترشحات خونی، ترشحات بزاقی یا ترشحات تنفسی) و اطراف چشم (جهت جلوگیری از تماس احتمالی آئروسل‌های عفونی معلق در هوا با چشم) را پیوшуند. ۶- گندزدایی نمودن مکرر تجهیزات حفاظت از چشم به ویژه پس از اتمام درمان هر بیمار. ۷- استفاده از گان یک‌بار مصرف و تعویض آن توسط دندانپزشک و پرسنل درمانی (دستیار) برای هر بیمار. ۸- استفاده از ژلهای ضدعفونی نمودن دست‌ها پیش از پوشیدن و پس از درآوردن دستکش. ۹- شست‌وشوی مکرر دست‌ها با آب و صابون به مدت حداقل ۲۰ ثانیه (به‌ویژه پیش و پس از هر بیمار) و ۱۰- دفع بهینه پسماندهای حاصل از مداخلات دندانپزشکی، براساس مفاد قانون دفع پسماندهای پزشکی (Safety Box)، پلاستیک مخصوص دفع زباله‌های عفونی، سطل زباله درب‌دار پدالی یا چشمی سنسوردار بدون دخالت دست و غیره.^{۵۸-۶۰}

۴- انواع ماسک براساس قابلیت پیشگیری از کووید-۱۹: ضمن توجه به جدول ۲، بدین موارد باید توجه ویژه نمود: ۱- در تمامی ماسک‌های مندرج در جدول، اولویت اول با سیل‌چک (Seal check) مناسب است. هر گونه ماسکی بدون سیل‌چک مناسب، فاقد کارآیی لازم می‌باشد. از این‌رو در پیشگیری از کووید-۱۹، استفاده صحیح از ماسک و سیل‌چک مناسب، از نوع ماسک بسیار مهم‌تر است. ۲- دقت شود موارد ردیف ۲، ۳ و ۱۶ جهت جلوگیری از ورود کروناویروس توصیه نمی‌شوند، حتی با وجود سیل‌چک ایده‌آل و نحوه استفاده صحیح. این موضوع به قدر این ویروس (و متعلقات آن) که بین ۵۰ الی ۲۰۰ نانومتر می‌باشد باز می‌گردد. ۳- سایر انواع ماسک (به‌جز سه

۲- روش‌های کاهش بار عفونی آئروسل‌ها و بهسازی هوا: پیشنهاد مبنی بر ۱- تهویه هوا اتاق درمان با فشار قوی و فیلتر هپا (HEPA)، یا تصفیه هوا اتاق درمان با سیستم مکش و فیلتر هپا (HEPA)، به‌ویژه اگر سیستم مکش (تصفیه) حاوی UVGI درونی (غیرقابل مشاهده مستقیم) باشد، ۲- تبدیل اتاق درمان به اتاق ایزولاسیون عفونت هوابی^{۳۶-۳۹}، ۳- استفاده از دستگاه استاندارد AIIR طبق دستورالعمل مربوطه.^{۳۶-۳۹} ۴- استفاده از دستگاه ایزولاتور (Extra oral high vacuum aspirator) مکش و گندزدایی آئروسل (حاوی درونی) مختص بالین بیمار با تجهیزات گندزدایی هوا، از جمله: اولویت اول (عالی)، گندزدایی هوا با سیستم‌های تهویه یا تصفیه هوا مبتنی بر اشعه ماوراءپنفش به ویژه UVC. در ضمن سیستم مکش (تصفیه) به انضمام سیستم درونی UVGI (غیرقابل مشاهده مستقیم)، ارجح بر لامپ‌های UVC دیواری، سقفی یا پرتابل (قابل مشاهده مستقیم) هستند. اولویت دوم (خوب)، گندزدایی هوا با دستگاه اکسیداتیو مه خشک (Dry Mist)، بر پایه هیدروژن پراکساید (ترجیحاً زیر یک درصد). اولویت سوم (متوسط)، گندزدایی هوا با دستگاه یون‌ساز (Modified active air-ionizer) device، اولویت چهارم (توصیه نمی‌شود)، گندزدایی هوا با دستگاه بر پایه ازن (Disinfection device using ozone gas) هستند. ۵- استفاده الزامی از رابردم (rubber dam)، ۶- استفاده الزامی از ساکشن فشار قوی (های وکیوم) داخل دهانی، ۷- استفاده ترجیحی از وسایل دستی جرمگیری در موارد غیر ضروری.^{۴۴-۴۷} و ۸- در راستای کاهش تعداد آئروسل‌های عفونی (ناقل ویروس SARS-CoV-2)، استفاده از دهان‌شویه پیش از آغاز کار برای بیمار، به ویژه دهان‌شویه‌های اکسیداتیو مانند هیدروژن پراکساید و پوویدون-ایودین توصیه می‌گردد.^{۴۸-۵۰} هر چند دهان‌شویه ستیل‌پیریدینوم (CPC) اکسیداتیو بوده، اما به علت عوارض مخاطی آن چندان توصیه نمی‌گردد. استفاده از کلره‌گرویدین طبق برخی تحقیقات تاثیر چندانی بر کروناویروس ندارد. اگرچه استفاده از دهان‌شویه به صورت عام از بار عفونی آئروسل‌های تولید شده می‌کاهد اما در این مبحث، آسیب‌پذیری کروناویروس به صورت خاص و دقت بالاتری سنجیده شده است.^{۵۱-۵۴} ۳- اصول کلی استفاده از تجهیزات حفاظت‌شخصی (Personal Protective Equipment, PPE) مطابق جدول ۱، برای پیشگیری از انتقال کروناویروس (SARS-CoV-2) حین مداخلات دندانپزشکی،

جدول ۱: تجهیزات حفاظت شخصی (Personal Protective Equipment, PPE) مورد نیاز کارکنان، بیماران (مراجعه کنندگان) و دندانپزشک.

دسترسی به ژل ضدغونوئی	دسترسی به عینک ایزوله	دسترسی به شیلد ایزوله	دسترسی به گان ایزوله	دسترسی به گان پارچه‌ای	دسترسی به ماسک N95	دسترسی به ماسک فیلتردار	دسترسی به ماسک ساده	دسترسی به کاور کفش	دسترسی به دستکش	دسترسی به درمانی (دستیار) پذیرش (تریاژ) بهداشتی (تنظیف) و اداری بیماران (مراجعه کنندگان) بیماران پرخطر بیماران کم خطر
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	درمانی (دستیار)
✓		✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	پذیرش (تریاژ)
✓	✓	✓	✓	✓		✓		✓	✓	بهداشتی (تنظیف) و CSR
✓							✓	✓	✓	اداری
✓							✓	✓	✓	بیماران (مراجعه کنندگان)
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	بیماران پرخطر
✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	✓	✓	بیماران کم خطر

منفی) و بازدم (آزمون فشار مثبت) باید بررسی گردد اما گروه B و C به عملت حضور دریچه یک طرفه، صرفا در حالت دم (آزمون فشار منفی) امکان پذیر خواهد بود.^۹

نکاتی در رابطه با آداب استفاده از ماسک: پیش از دور انداختن ماسک آن را در پلاستیک فریزری انداخته و درب آن را باید گره زد، پیش (احتمال آلوده شدن ماسک) و پس (احتمال آلوده شدن دست) از استفاده از ماسک دستها را با آب و صابون باید شست، اگرچه عمر مفید اکثر ماسک‌های یکبار مصرف حدوداً بین چهار الی هشت ساعت می‌باشد اما در صورت مشاهده آلودگی محرز باید بلافاصله تعویض گردد، پوشیدن و در آوردن ماسک، صرفا با استفاده از بند آن باید باشد و طی این دو مرحله از دست زدن به بدن ماسک باید پرهیز کرد. ۱۰- روش‌های گندزدایی نمودن ماسک در شرایط اجبار یا اضطرار: این موضوع به صورت کلی چندان توصیه نمی‌گردد و تا حد امکان باید از ماسک‌ها، به صورت یکبار مصرف استفاده نمود، اما بنا بر توصیه CDC در شرایط اجبار یا اضطرار، این موضوع براساس جدول ۳ امکان پذیر خواهد بود.^{۱۱}

۵- مدت زمان ماندگاری (مقاومت) کروناآپیروس-SARS-CoV-2: این موضوع که به صورت مشروح در جدول ۴ عنوان شده است، براساس قابلیت بیماری زایی بر روی سلول‌های کشت شده در محیط آزمایشگاه سنجیده شده است، از این رو منظور از ماندگاری (مقاومت) کروناآپیروس توصیه می‌شود (بهویژه به صورت دابل در صورت نبود ماسک N-95).^{۱۲-۱۳} ۸- سیل چک گروه A هنگام دم (آزمون فشار

مورد فوق الذکر) در صورت سیل چک مناسب، قابلیت جلوگیری از ورود کروناآپیروس را دارند. مجده تاکید می‌گردد سیل چک مناسب، ارجح بر نوع ماسک است. ۴- ماسک‌های دریچه‌دار (گروه B)، اصطلاحاً به اشتباه ماسک‌های فیلتردار عنوان می‌شوند. این دریچه‌های یک طرفه، صرفا جهت خروج هوا در هنگام بازدم می‌باشد و هیچ‌گونه نقش تصفیه‌ای (فیلترینگ) ندارند. ۵- ماسک‌های فیلتردار (گروه C)، ماسک‌های چندبار مصرف با فیلتر یکبار مصرف هستند که طیفی از فیلترهای یکبار مصرف بر اساس درصد فیلتراسیون و نیز اندازه ذرات، بر روی آن قابل نصب است. از این‌رو صرفا هنگام استفاده از فیلتر مناسب، توصیه می‌گردد. ۶- ماسک‌های کربن اکتیو (ردیف ۱۶)، با وجود داشتن دریچه یک طرفه، هیچ‌گونه اثری (یا در حد بسیار جزیی) بر فیلتراسیون کروناآپیروس ندارد و صرفا جهت جلوگیری از ورود بخارات و بوی بد (مثالاً زباله) و نیز ریزگردهای معلق موجود در آلودگی هوای شهری قابل استفاده است. این ماسک‌ها ظاهری شبیه ماسک‌های N-95 دارند، لذا هنگام خرید، به توضیحات مندرج بر روی ماسک باید دقت نمود. ۷- عیوب عمده ماسک‌های جراحی (پیشکی ۳ لایه) سیل چک نامناسب آن است، اما جنس آنها تا حد قابل قبولی، قابلیت فیلتراسیون ویروس را دارد. از این‌رو در صورت سیل چک مناسب، جهت جلوگیری ورود کروناآپیروس توصیه می‌شود (بهویژه به صورت دابل در صورت نبود ماسک N-95).^{۱۴-۱۵}

جدول، بدین موارد باید توجه نمود: -۱ پارامتر های جدول ۱، در محیط کشت آزمایشگاه و با رطوبت ۶۵٪ اندازه گیری شده است. -۲ طبق بند ۳ جدول ۳، برای شست و شوی

جدول ۲: انواع ماسک براساس قابلیت پیشگیری از کرونا ویروس (بین ۵۰ الی ۲۰۰ نانومتر) بررسی شده است. عدم تاثیر ماسک ردیف های ۲ و ۱۶ مورد توافق اکثر منابع می باشد

ردیف	توصیه	انواع ماسک				
		ماسک های ساده	(بدون درجه و بدون فیلتر)	براساس استاندارد اروپا (EN149:2001)	FFP-1	بالای ۵ میکرون
۱	بلی (تا حدی)					جراحی (لایه پزشکی)
۲	خیر					پارچه ای
۳	خیر					اسفنجی
فیلتراسیون						
اندازه ذرات						
۴						%۸۰
۵	بلی					%۹۴
۶	(۴ الی ۱۵)					%۹۹
۷						%۹۵
۸						%۹۹
۹						%۹۹/۹۷
N-Type						
۱۰						%۹۵
۱۱						%۹۹
۱۲						%۹۹,۹۷
R-Type						
۱۳						%۹۵
۱۴						%۹۹
۱۵						%۹۹,۹۷
P-Type						
۱۶	خیر					
۱۷	بلی					
۱۸	(۱۷ الی ۱۹)					
۱۹						

جدول ۳: روش‌های گندزدایی ماسک. صرفاً روش‌های اول و دوم مورد توافق اکثر منابع می‌باشد، آن‌هم مشروط بر احراز شرایط اجراء اضطرار.

روش	مدت	قابلیت ضدغونه	توصیه	علت
۱ اشعه فرابنفش (UVC)	۱۵ دقیقه	بله	بله	عدم تاثیر بر روی نفوذناپذیری و میکرواستراکچر ماسک
۲ گرمای خشک ۷۰ درجه (Oven)	۳۰ دقیقه	بله	بله	عدم تاثیر بر روی نفوذناپذیری و میکرواستراکچر ماسک
۳ گرمای مرطوب ۷۰ درجه	۳۰ دقیقه	خیر	بله	دوره شدن الیاف و میکرواستراکچر ماسک
۴ الكل ۷۰ درصد	۵ دقیقه	خیر	بله	کاهش خاصیت الکترواستاتیک ماسک
۵ هیدروژن پراکساید (۵۰٪) درجه	۵۵ دقیقه	خیر	بله	کاهش نفوذناپذیری (افزایش نفوذناپذیری) ماسک

تقسیم‌بندی انواع ماسک براساس قابلیت پیشگیری از کووید-۱۹، براساس قابلیت فیلتراسیون ویروس SARS-CoV-2 با توجه به قطر این ویروس (بین ۵۰ الی ۲۰۰ نانومتر).

از ادامه زنجیره انتقال، بسیار حائز اهمیت می‌باشد و باید با دقت به ترتیب در طی پنج مرحله صورت پذیرد:

مرحله ۱: غربالگری غیرحضوری (Tele-screening) طی تماس صوتی یا تصویری توسط پرسنل تریاژ (پذیرش).

مرحله ۲: خود-غربالگری (Self-screening) بیماران.

مرحله ۳: غربالگری بیماران توسط پرسنل تریاژ (پذیرش).^{۷۱-۷۳}

مرحله ۴: غربالگری بیماران توسط دندانپزشک، و مرحله ۵: اتخاذ تصمیم با توجه به نتیجه غربالگری. مشروح این مراحل و چارت‌های مربوطه توسط معاونت درمان وزارت بهداشت در راستای همه‌گیری کووید-۱۹ ابلاغ گردیده و از وبسایت وزارت بهداشت قابل دانلود می‌باشد.^{۷۴-۷۶}

۸- رعایت اصول ارایه و دریافت خدمات پاراکلینیکال: در راستای کاهش احتمال انتقال کروناآپیوس بین بیماران (Probable cross-contamination) یا انتقال آن به پرسنل، کلیه مراکز ارایه دهنده خدمات پاراکلینیکال دندانپزشکی، موظف به رعایت دقیق دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت در رابطه با کنترل عفونت، حين ارایه خدمات در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹ می‌باشند.

این مراکز شامل: ۱- مراکز رادیولوژی دهان، فک و صورت، ۲- لابراتوارهای پرتوگرافی دندانی.

۳- مراکز فوتونگرافی می‌گردد. در ضمن دریافت خدمات از این مراکز پاراکلینیکال توسط مراکز دندانپزشکی نیز باید طبق اصول کنترل عفونت و دستورالعمل ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت صورت پذیرد.^{۷۷-۸۱}

دست‌ها، پیش‌تر به اشتباه ادعا شده بود ۲۰ ثانیه تماس آب و صابون با کروناآپیوس سبب از بین رفتن ساختار آن می‌شود، اما اخیراً اثبات شده است ۲۰ ثانیه شستشوی صحیح، کروناآپیوس را می‌شوید و می‌برد، اما تخریب نمی‌کند.

۴- اسیدی و قلیایی بودن محیط (معادل PH از ۳ تا ۱۰ دمای ۲۲°C) تاثیری در از بین بردن آن نداشته و کروناآپیوس به تغییرات PH در این بازه مقاوم می‌باشد.^{۶۶}

۶- نحوه تهیه محلول گندزدایی کننده بر پایه هیپوکلریت‌سدیم و اندیکاسیون آن: برای رقیق‌سازی و استفاده از هیپوکلریت‌سدیم به عنوان محلول گندزدا مطابق جدول ۵، رعایت موارد زیر ضروری است: ۱- از عینک، ماسک، دستکش و پیش‌بند ضدآب استفاده شود، ۲- استفاده از عینک برای محافظت از چشم در برابر پاشیدن احتمالی، اکیدا توصیه می‌شود.

۳- هیپوکلریت‌سدیم را در اتاقی با تهویه بالا باید با آب مخلوط نمود. ۴- هیپوکلریت‌سدیم باید با آب سرد مخلوط گردد، زیرا آب گرم باعث تجزیه هیپوکلریت‌سدیم شده و آن را ناکارآمد می‌نماید. هرچند با توجه به اینکه هیپوکلریت‌سدیم بوى نامطبوع و عوارض تنفسی احتمالی در صورت استفاده مکرر دارد، می‌توان در موارد امکان‌پذیر از مواد گندزدای ترکیبی با مقبولیت بهتر همچون اکسیداسیون توسط گاز پلاسمای هیدروژن‌پراکسید (مهخشک) با غاظت حداقل شش دهم درصد، گندزدایی هوا توسط دستگاه یون‌ساز UV-C و گندزدایی هوا و سطوح با اشعه ماوراء‌نور به ویژه تایپ C استفاده نمود.^{۷۸-۷۹}

۷- نحوه غربالگری بیماران: غربالگری بیماران جهت جلوگیری

جدول ۴: مدت زمان مقاومت (ماندگاری) کروناویروس SARS-CoV-2 بر اساس دما، سطوح و مواد ضدغونی. منظور از ماندگاری (مقاومت) ویروس، حفظ قابلیت بیماری زایی آن است.

بر اساس دما	بر روی سطوح	میزان مقاومت (پایداری)	میزان مقاومت (پایداری)	میزان مقاومت (پایداری)
دما	سطح	مقاومت	نوع ضدغونی کننده	مدت زمان مقاومت (ماندگاری)
۴ °C	کاغذ	سه ساعت	هیپوکلریت رقیق شده با نسبت ۱۹ به ۱	مدت زمان مقاومت (ماندگاری)
۲۲ °C	چوب	دو روز	(رقیق‌سازی ۵٪ با درصد کلر فعال ۰/۰۲۵٪)	کمتر از پنج دقیقه*
۳۷ °C	پارچه	دو روز	الکل رقیق شده ۷۰٪	کمتر از پنج دقیقه*
۵۶ °C	شیشه	چهار روز	آب و صابون (دما ۲۲ °C)	کمتر از ۱۵ دقیقه
۷۰ °C	استیل پلاستیک	۷ روز	سطح	هرچند ممکن است در مدتی کمتر نابودی ویروس صورت پذیرد، اما با توجه به لحاظ نمودن حاشیه اطمینان کافی، بین دو بیمار این پنج دقیقه ضدغونی با هایپو ۵٪ رقیق شده (قانون ۵-۵) رعایت گردد.
۷۰ °C	دالخی ماسک	۷ روز	سطح	
۷۰ °C	خارجی ماسک	بیش از هفت روز	سطح	
۷۰ °C	پنج دقیقه			

* هرچند ممکن است در مدتی کمتر نابودی ویروس صورت پذیرد، اما با توجه به لحاظ نمودن حاشیه اطمینان کافی، بین دو بیمار این پنج دقیقه ضدغونی با هایپو ۵٪ رقیق شده (قانون ۵-۵) رعایت گردد.

جدول ۵: نسبت تهیه و اندیکاسیون محلول گندزدا بر پایه هیپوکلریت‌سیدیم. مراکز دندانپزشکی و حرف‌وایسته مشمول ردیف سوم می‌شوند.

سطح آلودگی	کاربرد	درصد کلر فعال واحد	معیار رقیق‌سازی قاشق (هایپو)	درصد کلر در ۱۰۰ در لیوان (آب)	آب (cc)	هایپو (cc)	درصد	معیار رقیق‌سازی قاشق در ۴ لیوان	نحوه تهیه یک لیتر محلول
کم	غیر بحرانی	٪/۰/۰۵	۹۹ به ۱	۱ در ۱۰۰	۹۹۰	۱۰	۱	۱ قاشق در ۴ لیوان	
متوسط	نیمه بحرانی	٪/۰/۱	۴۹ به ۱	۲ در ۱۰۰	۹۸۰	۲۰	۲	۲ قاشق در ۴ لیوان	
بالا	بحرانی	٪/۰/۲۵	۱۹ به ۱	۵ در ۱۰۰	۹۵۰	۵۰	۵	۵ قاشق در ۴ لیوان	
بسیار بالا	بی خطر کردن نمونه‌های بالینی مشکوک	٪/۰/۵	۹ به ۱	۱۰ در ۱۰۰	۹۰۰	۱۰۰	۱۰	۱۰ قاشق در ۴ لیوان	
شدیداً بالا	ترشحات خونی و اسهال و ...	٪/۱	۱ به ۴	۲۰ در ۱۰۰	۸۰۰	۲۰۰	۲۰	۲۰ قاشق در ۴ لیوان	

بحث

مداخلات دندانپزشکی، و دوم ارتباط نزدیک دندانپزشک و دستیاران
وی حین مداخلات درمانی برای بیماران. از این‌رو مواردی را جهت
کنترل بهینه این دو موضوع باید با توجه خاص رعایت نمود که
گزیده‌ای از مهمترین آنها را در این قسمت مورد بحث قرار می‌دهیم:
۱- کاهش حداکثری احتمال تولید آئروسل‌های عفونی حامل
کرونایروس: در کلیه منابع، توصیه قاطع بر این است که مراکز
دندانپزشکی تمیزات لازم جهت کاهش حداکثری احتمال تولید
آئروسل‌های عفونی حامل کرونایروس را مدنظر قرار دهند، ازجمله:
۱- تهویه اتاق درمان با فشار قوی و فیلتر با کارآیی بالا (HEPA).^{۸۴-۸۷}

بهداشت شغلی، علم و هنر پیش‌بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل
عوامل مخاطره‌آمیز در محیط‌های کاری می‌باشد.^{۸۲} ازجمله موارد
مخاطره‌آمیز، عوامل زیستی (شامل ویروس‌ها، باکتری‌ها، قارچ‌ها و
غیره) می‌باشند. با توجه به جدول ۶، دندانپزشکان و حرف‌وابسته
ازجمله پریسک‌ترین مشاغل و از صدرنشینان چارک اول در مواجه
با کرونایروس می‌باشند.^{۸۳} این رتبه از دو منظر قابل بحث می‌باشد،
ابتدا وفور تولید آئروسل‌های عفونی حامل کرونایروس حین

جدول ۶: ریسک برخی از مشاغل در مواجه با کرونایروس. دندانپزشکان و حرف‌وابسته ازجمله پریسک‌ترین مشاغل و از صدرنشینان چارک اول در مواجه با کرونایروس می‌باشند.

Dental Hygienist	بهداشت کاران دهان و دندان	۱	
Family and General Practitioners	پزشکان عمومی و پزشکان خانواده	۲	
Dental Assistants	دستیاران دندانپزشک	۳	
Dentists	دندانپزشکان	۴	چارک اول (۱ الی ۷)
Paramedics	پیراپزشکان	۵	
Nurses	پرستاران	۶	
Flight Attendants	مهمنداران پرواز	۷	
Courier	پیک‌ها	۸	
Kindergarten Teachers	مریبان مهدکودک	۹	
Garbage Collectors	رفتگران	۱۰	چارک دوم (۸ الی ۱۲)
Police	نیروی‌های انتظامی	۱۱	
Maids	پیشخدمت‌ها	۱۲	
Preschool Teachers	معلمان پیش‌دبستانی	۱۳	
Janitors	سرایدارها	۱۴	
Elem-school Teachers	معلمان ابتدایی	۱۵	
Firefighters	آتش‌نشانان	۱۶	چارک سوم (۱۳ الی ۲۰)
Childcare Workers	کودکان کار	۱۷	
Hairdressers	آرایشگران	۱۸	
Cashiers	صندوق‌داران	۱۹	
Pilots	خلیلانان	۲۰	
Lawyers	وکلا	۲۲	
Fast-food Workers	پرسنل فست فود	۲۳	چارک چهارم (۲۲ الی ۲۴)
اکثر مشاغل غیرپزشکی جامعه			۲۴

از آنگل، توربین، هندپیس، فرز، فایل و غیره) جهت انجام کلیه امور درمانی به صورت جداگانه برای هر بیمار (توربین استریل یکبار مصرف ارجح بر توربین قابل اتوکلاو می‌باشد و توربین قابل اتوکلاو با والو یک طرفه (Anti-retraction valve) (Anti-retraction valve) در اولویت بر انواع ساده می‌باشد)، استفاده از Safety box در مجاور سطل زباله درب دار پدالی یا چشمی سنسوردار بدون دخالت دست.^۳-
تجهیزات ترجیحی (اختیاری) مورد نیاز ارایه خدمات دندانپزشکی، از جمله: دستگاه تب‌سنج دیجیتال، دستگاه پالس اکسی متر، استفاده از دریچه‌های یک‌طرفه (Anti-retraction valve) در یونیت (بهویژه در پوآب و هوای ارایه کاور کش، ماسک و ژل ضد عفونی دست به بیماران پیش از ورودی سالن انتظار.^۴- تجهیزات حفاظت‌شخصی طبق دستورالعمل ابلاغی وزارت بهداشت.^۵- نصب الزامی پوسترها آموزشی ابلاغ شده وزارت بهداشت در معرض دید مراجعه‌کنندگان، از جمله: فرم تریاژ و غربالگری بیماران، فرم خود- غربالگری (Self-screening) (Self-protection) بیماران، گزیده‌نکات آموزشی محافظت‌شخصی (Self-protection) مراجعة‌کنندگان در برابر کروناویروس، و گزیده‌نکات آموزشی محافظت‌شخصی (Self-protection) پرسنل در برابر کروناویروس.^{۹۹-۱۰۱}
^۳- تجهیزات حفاظت‌شخصی مورد نیاز در هر شیفت کاری: برای پیشگیری از انتقال کروناویروس حین مداخلات دندانپزشکی، حفاظت‌شخصی دندانپزشک و کلیه پرسنل از جمله: پرسنل بهداشتی (تنظیف)، تریاژ (پذیرش)، درمانی (ستیار)، CSR و اداری، باید مطابق جدول شماره هفت صورت پذیرد. تجهیزات حفاظت‌شخصی مندرج در این جدول با احتساب پنج بیمار در هر شیفت کاری چهار ساعته و فرض نمودن یک نفر پرسنل به ازای هر حیطه کاری تنظیم گردیده است. واضح است که در صورت افزایش تعداد پرسنل و/یا بیماران، تعداد اقلام مندرج باید مجدداً تطبیق داده شود. در رابطه با این جدول، بدین موارد باید توجه نمود: -۱- دندانپزشک و کلیه پرسنل (به‌جز پرسنل اداری) ملزم به استفاده از گان پارچه‌ای و کلاه پارچه‌ای (از ابتداء تا انتهای شیفت) هستند و بر روی آن گان یک‌بار مصرف و کلاه یک‌بار مصرف (پارچه نانو وون) پوشیده می‌شود، -۲- بلندی گان مورد استفاده باید تا زیر زانو (و نه کوتاه‌تر) باشد و باید یک‌بار مصرف بوده و پس از اتمام درمان هر بیمار تعویض گردد، -۳- در صورت نبودن

- تبدیل اتاق درمان به اتاق ایزولاسیون عفونت‌های هوایی (Airborne infection isolation room, AIIR)^{۸۸-۹۱} - استفاده از دستگاه استاندارد مکش و گندزدای آئروسل‌های عفونی حامل کروناویروس مختص بالین بیمار (Extra oral high vacuum aspirator)^۴- تجهیز اتاق درمان به تجهیزات گندزدایی هوا که از چهار طریق به ترتیب کارآیی قابل دستیابی است: گندزدایی هوا با اشعه ماوراینفلش (Ultraviolet germicidal irradiation, UVGI) به ویژه تایپ C، گندزدایی هوا با دستگاه اکسیداتیو مه خشک (Dry Mist) بر پایه هیدروژن پراکساید و ترجیحاً با غلظت زیر یک درصد، (Modified active air-ionizer) گندزدایی هوا با دستگاه یون‌ساز (Disinfection device) و گندزدایی هوا با دستگاه بر پایه ازن (using ozone gas) هرجند روش اخیر چندان توصیه نمی‌گردد.^{۹۲-۹۵}
- استفاده الزامی از رابردم، -۶- استفاده الزامی از ساکشن فشار قوی، و -۷- استفاده ترجیحی از وسایل دستی جرم‌گیری در موارد غیر ضروری.^{۹۵-۹۸}

- حداقل‌های مورد نیاز: اهم حداقل‌های مورد نیاز ارایه خدمات دندانپزشکی در شرایط همه‌گیری کووید-۱۹ شامل موارد ذیل می‌گردد: ۱- تجهیزات الزامی (اجباری) جهت استریل ابزار و گندزدای سطوح، از جمله: اتوکلاو تایپ B. انواع محلول‌های گندزدای سطوح، محلول یا ژل ضد عفونی کننده دست و سایر تجهیزات جهت تکمیل لاین CSR مرکز دندانپزشکی جهت استریل بودن وسایل مصرفی. شایان ذکر است که با توجه به ساختار کروناویروس جدید (SARS-CoV-2) که پوشش دار بوده و حساس به ترکیبات اکسیداتیو (High level disinfectant) و فنولی (Low level disinfectant) است، در راستای ضد عفونی محیط، تجهیزات حفاظت شخصی و یونیت دندانپزشکی می‌توان از مواد گندزدا پزشکی یا صنعتی طبق دستورالعمل کارخانه سازنده، جهت غیرفعال کردن ویروس‌های دارای غشای لیپیدی (مانند HIV، هپاتیت B و خانواده کروناویروس) استفاده نمود. به عنوان مثال، فنل در غلظت دو درصد، اکثر میکروب‌ها را از بین می‌برد اما در غلظت‌های بالاتر می‌تواند عوارض توکسیک برای اپراتور داشته باشد. این موضوع برای هیدروژن پراکساید در غلظت‌های بالاتر از شش دهم درصد نیز صادق است. ۲- تجهیزات الزامی (اجباری) مورد نیاز ارایه خدمات دندانپزشکی، از جمله: استفاده از پکیج‌های یک‌بار مصرف استریل (اعم

جدول ۷: تجهیزات حفاظت شخصی (Personal Protective Equipment, PPE) مورد نیاز در هر شیفت کاری

حیطه کاری	تعداد افراد مفروض									
	گان	گان یک بار	کلاه	کلاه یک	دستکش	عینک/شلد	ایزوله	N95	مسک جراحی (ساده)	
پرسنل تریاژ (پذیرش)	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰	۰	۰
پرسنل بهداشتی (تنظیف) و CSR	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۱	۰
پرسنل درمانی (دستیار)	۱	۱	۵	۵	۱	۵	۱	۰	۱	۰
دندانپزشک	۱	۱	۵	۵	۱	۵	۱	۰	۱	۰
پرسنل اداری	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۰	۱	۰	۱
مجموع	۴	۴	۱۲	۱۲	۴	۱۲	۴	۱	۱	۱

کلیه اعداد جدول بر مبنای پنج بیمار در هر شیفت می‌باشد.

و غیره، گندزدایی دوره‌ای کلیه سطوح مرتبط با پذیرش، سالن انتظار، آسانسور، دستگیره‌ها و غیره با فواصل زمانی کوتاه، تاکید به بیماران به عدم مراجعه با حضور شخص ثالث همراه در موارد غیرضروری، استفاده از سطلهای زیاله درب دار پدالی یا چشمی سنسوردار بدون دخالت دست، عدم اجازه ورود وسائل همراه بیمار (کیف، چتر، کلاه و غیره) و نیز همراهان احتمالی بیمار به بخش درمان و ایجاد تهويه قوی و مناسب در کل فضای مرکز درمانی، از جمله در سالن پذیرش، انتظار و بهویژه بخش درمان، ۲- چکلیست الزامات حفاظت‌شخصی بیماران، شامل: نصب پوسترهای آموزشی حفاظت‌شخصی بیماران در بیماران، شامل: رعایت فاصله ۱/۸ متر بین صندلی‌های بیماران عرض دید، رعایت فاصله ۱/۸ الی ۲ متر بین صندلی‌های بیماران در سالن انتظار، رعایت فاصله ۱/۸ الی ۲ متر بیماران با پرسنل تریاژ (پذیرش) حین ارتباط کلامی و انجام امور پذیرش و یا ترخیص، استفاده از ماسک، چاپ و ارایه فرم خود-غربالگری ابلاغ شده وزارت بهداشت قبل از درب ورودی به کلیه بیماران، و استفاده از ژل ضدغونی دست پیش از ورود ^{۱۰۲-۱۰۵} ۳- چکلیست الزامات آموزشی پرسنل بهداشتی (تنظیف)، تریاژ (پذیرش)، درمانی (دستیار)، CSR و اداری، شامل: آموزش پرسنل پذیرش در رابطه با اصول تریاژ و غربالگری بیماران مصوب وزارت بهداشت، کترول و بررسی فرم خود-غربالگری مصوب وزارت بهداشت که بیماران تکمیل نموده‌اند توسط پرسنل پذیرش، کترول و بررسی پرونده پزشکی مختص مرکز دندانپزشکی که بیماران تکمیل

MASK N95 می‌توان از دو عدد ماسک سه‌لایه جراحی جهت جلوگیری از ورود آثرولی به سیستم تنفسی استفاده نمود. ۴- در Seal Check ماسک بسیار دقت نمایید. ۵- نیازی به استفاده از دستکش دولایه نیست. ۶- عمر مفید ماسک N95 و ماسک ساده جراحی به ترتیب معادل هشت و چهار ساعت استفاده مدام می‌باشد، اما در صورت آلودگی محرز (قابل رویت) باید تعویض گردد. ۷- ترجیح بر استفاده از مقننه ضدآب نسبت به مقننه‌های عادی برای بانوان. ۸- توصیه بر استفاده از کاورهای ضدآب یکبار مصرف برای کفش. ۹- ترجیح بر استفاده از گان‌های کلاه‌دار یکپارچه (گان ایزوله بیمارستانی) نسبت به گان‌های پارچه‌ای (جراحی) مرسوم.^{۶۰-۶۵}

۴- رعایت دقیق چکلیست‌های مرتبط با هر حیطه: در راستای مدیریت بهینه کلیه بخش‌های مرکز درمانی دندانپزشکی، مدیریت هر حیطه باید بر اساس چکلیست‌های مرتبط صورت پذیرش و موارد ذیل می‌گردد: ۱- چکلیست الزامات فضای سالن پذیرش و انتظار، شامل: احتمال مواجهه نزدیک (زیر ۱/۸ متر) بین بیماران و/یا با پرسنل را به حداقل برسانید (فاصله ایده‌آل ۲ m است)، رعایت فاصله ۱/۸ الی ۲ متر بین صندلی‌های بیماران حین انتظار، رعایت فاصله ۱/۸ الی ۲ متر بیماران با پرسنل تریاژ (پذیرش) حین ارتباط کلامی، فاصله زمانی ۰-۴ دقیقه بین نوبت بیماران جهت تهويه مناسب و گندزدایی بهینه محیط و سطوح و عدم ایجاد تراکم در سالن انتظار، حذف کلیه وسائل مشترک در سالن انتظار مانند قنادان، مجله، روزنامه

دارای بیماری‌های زمینه‌ای در محل کار اتخاذ گردد و تعریف مجدد زباله‌های عفنی، با توجه به راههای انتقال کرونایروس، ۴-چکلیست الزامات آموزشی مراجعین، شامل: تکمیل فرم خود-غربالگری (Self-screening) که توسط وزارت بهداشت ابلاغ گردیده است پیش از تشکیل پرونده مختص به مرکز، رعایت آداب شست‌وشوی دست‌ها، رعایت آداب استفاده از ماسک، رعایت آداب سرفه و عطسه و مطالعه علاجیم بیماری کووید-۱۹ و اطلاع از تشابهات و تفاوت‌های علایم با آنفلانزا و سرماخوردگی.

۵- چکلیست الزامات سیستم ارجاع پزشکی بیماران توسط پرسنل تریاژ (پذیرش)، شامل: نصب شماره‌های ضروری مراکز مرتبط با مدیریت همه‌گیری کووید-۱۹ در معرض دید، نصب چارت تریاژ و ارجاع بیماران مشکوک یا مبتلا به کووید-۱۹ در معرض دید، انجام مانور مواجهه با شرایط فوریت‌پزشکی، در ارتباط و هماهنگ بودن با نزدیکترین مرکز اورژانس به صورت مقدم بر پیش‌آمدن شرایط فوریت‌پزشکی، و تامین وسایل اساسی اورژانس جهت مدیریت شرایط فوریت‌پزشکی در صورت وقوع.^{۱۰-۱۱}

نموده‌اند توسط پرسنل پذیرش، مطالعه و رعایت اصول حفاظت‌شخصی مصوب وزارت بهداشت توسط کلیه پرسنل، رعایت دقیق اصول کترل‌عفونت نسبت به شرایط غیربهرانی توسط کلیه پرسنل، آموزش آداب کترل‌عفونت و حفاظت‌شخصی (Self-protection) به بیماران توسط پرسنل پذیرش و درمانی. فرآیندهای کاری توسط کلیه پرسنل طوری بازتعریف شود که دست به دست شدن وسایل، مدارک و تجهیزات به حداقل برسد، بهتر است سرویس بهداشتی پرسنل از سرویس بهداشتی مورد استفاده مراجعین مجزا باشد. آموزش نحوه Seal check ماسک‌های دریچه‌دار (صرف‌با‌مکش) و ساده (با دمیان و مکش)، زیرا ماسک غیرسیل، عملاً کاهش ضربی اطمینان دارد، عدم مصرف هرگونه خوراکی یا غذا در محیط دندانپزشکی توسط پرسنل، آموزش پرسنل بهداشتی در رابطه با نحوه ساخت و رقیق‌سازی محلول‌های گندздای بر پایه هیپوکلریت‌سدیم، حضور و غیاب به‌طور موقت با اثر انگشت ثبت نگردد و کتبی (توضیح شخص واحد) یا با سنسور تشخیص چهره بررسی گردد، تمهیدات لازم جهت عدم حضور پرسنل (بهویژه پرسنل درمانی)

References

- Xu Z, Shi L, Wang Y, Zhang J, Huang L, Zhang C, et al. Pathological findings of COVID-19 associated with acute respiratory distress syndrome. *Lancet Respir Med* 2020;8(4):420-2.
- Kim JY, Choe PG, Oh Y, Oh KJ, Kim J, Park SJ, et al. The first case of 2019 novel coronavirus pneumonia imported into Korea from Wuhan, China: implication for infection prevention and control measures. *J Korean Med Sci* 2020;35(5).
- Zhu N, Zhang D, Wang W, Li X, Yang B, Song J, et al. China Novel Coronavirus Investigating and Research Team. A Novel Coronavirus from Patients with Pneumonia in China, 2019. *N Engl J Med* 2020;382(8):727-33.
- Wilson ME, Chen LH. Travellers give wings to novel coronavirus (2019-nCoV). *J Travel Med* 2020;27(2).
- Wang C, Horby PW, Hayden FG, Gao GF. A novel coronavirus outbreak of global health concern. *Lancet* 2020;395(10223):470-3.
- Tang D, Comish P, Kang R. The hallmarks of COVID-19 disease. *PLoS Pathog* 2020;16(5):e1008536.
- Tyrrell DA, Bynoe ML, Hoorn B. Cultivation of "difficult" viruses from patients with common colds. *Br Med J* 1968;1(5592):606-10.
- Falsey AR, Walsh EE. Novel coronavirus and severe acute respiratory syndrome. *Lancet* 2003;361(9366):1312-3.
- The Lancet. MERS-CoV: a global challenge. *Lancet* 2013;381(9882):1960.
- Fehr AR, Perlman S. Coronaviruses: an overview of their replication and pathogenesis. *Methods Mol Biol* 2015;1282:1-23.
- Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Song ZG, et al. A new coronavirus associated with human respiratory disease in China. *Nature* 2020;579(7798):265-9.
- Hu B, Zeng L-P, Yang X-L, Ge X-Y, Zhang W, Li B, et al. Discovery of a rich gene pool of bat SARS-related coronaviruses provides new insights into the origin of SARS coronavirus. *PLoS pathogens* 2017;13(11):e1006698.
- Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. *Lancet* 2020;395(10223):514-23.
- Lam TT, Jia N, Zhang YW, Shum MH, Jiang JF, Zhu HC, et al. Identifying SARS-CoV-2-related coronaviruses in Malayan pangolins. *Nature* 2020;583(7815):282-5.
- Wan Y, Shang J, Graham R, Baric RS, Li F. Receptor Recognition by the Novel Coronavirus from Wuhan: an Analysis Based on Decade-Long Structural Studies of SARS Coronavirus. *J Virol* 2020;94(7):e00127-20.
- Ge XY, Li JL, Yang XL, Chmura AA, Zhu G, Epstein JH, et al. Isolation and characterization of a bat SARS-like coronavirus that uses the ACE2 receptor. *Nature* 2013;503(7477):535-8.
- Velavan TP, Meyer CG. The COVID-19 epidemic. *Trop Med Int Health* 2020;25(3):278-280.
- Huang C, Wang Y, Li X, Ren L, Zhao J, Hu Y, et al. Clinical features of patients infected with 2019 novel coronavirus in Wuhan, China. *Lancet* 2020;395(10223):497-506.
- Sohrabi C, Alsafi Z, O'Neill N, Khan M, Kerwan A, Al-Jabir A, et al. Corrigendum to "World Health Organization declares Global Emergency: A review of the 2019 Novel Coronavirus (COVID-19)" [Int. J. Surg. 76 (2020) 71-76]. *Int J Surg* 2020;77:217.
- Ahmed AE. Incidence of coronavirus disease (COVID-19) and countries affected by malarial infections. *Travel Med Infect Dis* 2020;37:101693.
- Bogoch II, Watts A, Thomas-Bachli A, Huber C, Kraemer MUG, Khan K. Pneumonia of unknown aetiology in Wuhan, China: potential for international spread via commercial air travel. *J Travel Med* 2020;27(2):taaa008.

22. Heymann DL, Shindo N; WHO Scientific and Technical Advisory Group for Infectious Hazards. COVID-19: what is next for public health?. *Lancet* 2020;395(10224):542-5.
23. Chen N, Zhou M, Dong X, Qu J, Gong F, Han Y, et al. Epidemiological and clinical characteristics of 99 cases of 2019 novel coronavirus pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study. *Lancet* 2020;395(10223):507-513.
24. Li Q, Guan X, Wu P, Wang X, Zhou L, Tong Y, et al. Early Transmission Dynamics in Wuhan, China, of Novel Coronavirus-Infected Pneumonia. *N Engl J Med* 2020;382(13):1199-1207.
25. Chan JF, Yuan S, Kok KH, To KK, Chu H, Yang J, et al. A familial cluster of pneumonia associated with the 2019 novel coronavirus indicating person-to-person transmission: a study of a family cluster. *Lancet* 2020;395(10223):514-23.
26. Zhao S, Stone L, Gao D, Musa SS, Chong MKC, He D, et al. Imitation dynamics in the mitigation of the novel coronavirus disease (COVID-19) outbreak in Wuhan, China from 2019 to 2020. *Ann Transl Med* 2020;8(7):448.
27. Bai Y, Yao L, Wei T, Tian F, Jin DY, Chen L, et al. Presumed Asymptomatic Carrier Transmission of COVID-19. *JAMA* 2020;323(14):1406-7.
28. Lu R, Zhao X, Li J, Niu P, Yang B, Wu H, et al. Genomic characterisation and epidemiology of 2019 novel coronavirus: implications for virus origins and receptor binding. *Lancet* 2020;395(10224):565-74.
29. Jiang F, Deng L, Zhang L, Cai Y, Cheung CW, Xia Z. Review of the Clinical Characteristics of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). *J Gen Intern Med* 2020;35(5):1545-9.
30. Lan L, Xu D, Ye G, Xia C, Wang S, Li Y, et al. Positive RT-PCR Test Results in Patients Recovered From COVID-19. *JAMA* 2020;323(15):1502-3.
31. Poon LL, Chan KH, Wong OK, Yam WC, Yuen KY, Guan Y, et al. Early diagnosis of SARS coronavirus infection by real time RT-PCR. *J Clin Virol* 2003;28(3):233-8.
32. Volgenant CMC, de Soet JJ. Cross-transmission in the Dental Office: Does This Make You Ill? *Curr Oral Health Rep* 2018;5(4):221-8.
33. Mitton C, Adair CE, McKenzie E, Patten SB, Waye Perry B. Knowledge transfer and exchange: review and synthesis of the literature. *Milbank Q* 2007;85(4):729-68.
34. Ramphul K, Mejias SG. Coronavirus Disease: A Review of a New Threat to Public Health. *Cureus* 2020;12(3):e7276.
35. Peng X, Xu X, Li Y, Cheng L, Zhou X, Ren B. Transmission routes of 2019-nCoV and controls in dental practice. *Int J Oral Sci* 2020;12(1):9.
36. Lu CW, Liu XF, Jia ZF. 2019-nCoV transmission through the ocular surface must not be ignored. *Lancet* 2020;395(10224):e39.
37. Rothe C, Schunk M, Sothmann P, Bretzel G, Froeschl G, Wallrauch C, et al. Transmission of 2019-nCoV Infection from an Asymptomatic Contact in Germany. *N Engl J Med* 2020;382(10):970-1.
38. Otter JA, Yezli S, Salkeld JA, French GL. Evidence that contaminated surfaces contribute to the transmission of hospital pathogens and an overview of strategies to address contaminated surfaces in hospital settings. *Am J Infect Control* 2013;41(5 Suppl):S6-S11.
39. Ge ZY, Yang LM, Xia JJ, Fu XH, Zhang YZ. Possible aerosol transmission of COVID-19 and special precautions in dentistry. *J Zhejiang Univ Sci B* 2020;21(5):361-8.
40. Kobza J, Pastuszka JS, Bragoszewska E. Do exposures to aerosols pose a risk to dental professionals? *Occup Med (Lond)* 2018;68(7):454-8.
41. Jones RM, Brosseau LM. Aerosol transmission of infectious disease. *J Occup Environ Med* 2015;57(5):501-8.
42. Sawhney A, Venugopal S, Babu GR, Garg A, Mathew M, Yadav M, et al. Aerosols how dangerous they are in clinical practice. *J Clin Diagn Res* 2015;9(4):ZC52-7.
43. Lemieux C, Brankston G, Gitterman L, Hirji Z, Gardam M. Questioning Aerosol Transmission of Influenza. *Emerg Infect Dis* 2007;13(1):173.
44. Belser JA, Gustin KM, Katz JM, Maines TR, Tumpey TM. Influenza virus infectivity and virulence following ocular-only aerosol inoculation of ferrets. *J Virol* 2014;88(17):9647-54.
45. Shahidi Bonjar AH. Expandable Micro-motor Bur, design of a new device for least invasive extraction of broken teeth roots. *Ann Surg Innov Res* 2013;7(1):2.
46. Grenier D. Quantitative analysis of bacterial aerosols in two different dental clinic environments. *Appl Environ Microbiol* 1995;61(8):3165-8.
47. Feres M, Figueiredo LC, Faveri M, Stewart B, de Vizio W. The effectiveness of a preprocedural mouthrinse containing cetylpyridinium chloride in reducing bacteria in the dental office. *J Am Dent Assoc* 2010;141(4):415-22.
48. Retamal-Valdes B, Soares GM, Stewart B, Figueiredo LC, Faveri M, Miller S, et al. Effectiveness of a pre-procedural mouthwash in reducing bacteria in dental aerosols: randomized clinical trial. *Braz Oral Res* 2017;31:e21.
49. Santos IR, Moreira AC, Costa MG, Castellucci e Barbosa Md. Effect of 0.12% chlorhexidine in reducing microorganisms found in aerosols used for dental prophylaxis of patients submitted to fixed orthodontic treatment. *Dental Press J Orthod* 2014;19(3):95-101.
50. Hunter A, Kalathinal S, Shrout M, Plummer K, Looney S. The effectiveness of a pre-procedural mouthrinse in reducing bacteria on radiographic phosphor plates. *Imaging Sci Dent* 2014;44(2):149-54.
51. Sethi KS, Mamajiwala A, Mahale S, Raut CP, Karde P. Comparative evaluation of the chlorhexidine and cinnamon extract as ultrasonic coolant for reduction of bacterial load in dental aerosols. *J Indian Soc Periodontol* 2019;23(3):226-33.
52. Pinheiro SL, Silva CCD, Silva LAD, Cicotti MP, Bueno CEDS, Fontana CE, et al. Antimicrobial efficacy of 2.5% sodium hypochlorite, 2% chlorhexidine, and ozonated water as irrigants in mesiobuccal root canals with severe curvature of mandibular molars. *Eur J Dent* 2018;12(1):94-9.
53. Fine DH, Mendieta C, Barnett ML, Furgang D, Meyers R, Olshan A, et al. Efficacy of preprocedural rinsing with an antiseptic in reducing viable bacteria in dental aerosols. *J Periodontol* 1992;63(10):821-4.
54. Shahidi Bonjar AH. Antiviral therapy: a perspective. *Drug Des Devel Ther* 2016;10:541-546.
55. Yáñez Benítez C, Güemes A, Aranda J, Ribeiro M, Ottolino P, Di Saerio P, et al. Impact of Personal Protective Equipment on Surgical Performance During the COVID-19 Pandemic. *World J Surg* 2020;1-6.
56. Loveday HP, Lynam S, Singleton J, Wilson J. Clinical glove use: healthcare workers' actions and perceptions. *J Hosp Infect* 2014;86(2):110-6.
57. Olsen RJ, Lynch P, Coyle MB, Cummings J, Bokete T, Stamm WE. Examination gloves as barriers to hand contamination in clinical practice. *JAMA* 1993;270(3):350-3.
58. WHO Guidelines on Hand Hygiene in Health Care: First Global Patient Safety Challenge Clean Care Is Safer Care. Geneva: World Health Organization; 2009. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK144013/>
59. WHO Guidelines Approved by the Guidelines Review Committee. Geneva: World Health Organization; 2008-. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK132015/>
60. Larson EL, Early E, Cloonan P, Sugrue S, Parides M. An organizational climate intervention associated with increased handwashing and decreased nosocomial infections. *Behav Med* 2000;26(1):14-22.
61. Islam MS, Rahman KM, Sun Y, Qureshi MO, Chughtai AA, Seals H. Current knowledge of COVID-19 and infection prevention and control strategies in healthcare settings: A global analysis. *Infect Control Hosp Epidemiol* 2020;1-11.
62. Cheng KK, Lam TH, Leung CC. Wearing face masks in the community during the COVID-19 pandemic: altruism and solidarity. *Lancet* 2020;S0140-6736(20)30918-1.

63. Zhou Z, Yue D, Mu C, Zhang L. Mask is the possible key for self-isolation in COVID-19 pandemic. *J Med Virol* 2020;92(10):1745-6.
64. Narwani V, Kohli N, Lerner MZ. Application of a Modified Endoscopy Face Mask for Flexible Laryngoscopy During the COVID-19 Pandemic. *Otolaryngol Head Neck Surg* 2020;163(1):107-9.
65. Cheng VC, Wong SC, Chuang VW, So SY, Chen JH, Sridhar S, et al. The role of community-wide wearing of face mask for control of coronavirus disease 2019 (COVID-19) epidemic due to SARS-CoV-2. *J Infect* 2020;81(1):107-14.
66. Van Doremalen N, Bushmaker T, Morris DH, Holbrook MG, Gamble A, Williamson BN, et al. Aerosol and Surface Stability of SARS-CoV-2 as Compared with SARS-CoV-1. *N Engl J Med* 2020;382(16):1564-7.
67. Rubens JH, Karakousis PC, Jain SK. Stability and Viability of SARS-CoV-2. *N Engl J Med* 2020;382(20):1962-3.
68. Casey ML, Hawley B, Edwards N, Cox-Ganser JM, Cummings KJ. Health problems and disinfectant product exposure among staff at a large multispecialty hospital. *Am J Infect Control* 2017;45(10):1133-8.
69. Mupparapu M, Kothari KRM. Review of surface disinfection protocols in dentistry: a 2019 update. *Quintessence Int* 2019;50(1):58-65.
70. Kampf G, Todt D, Pfaender S, Steinmann E. Persistence of coronaviruses on inanimate surfaces and their inactivation with biocidal agents. *J Hosp Infect* 2020;104(3):246-51.
71. Jin YH, Cai L, Cheng ZS, Cheng H, Deng T, Fang YP, et al. A rapid advice guideline for the diagnosis and treatment of 2019 novel coronavirus (2019-nCoV) infected pneumonia (standard version). *Mil Med Res* 2020;7(1):4.
72. Liu Y, Yan LM, Wan L, Xiang TX, Le A, Liu JM, et al. Viral dynamics in mild and severe cases of COVID-19. *Lancet Infect Dis* 2020;20(6):656-7.
73. Xu K, Cai H, Shen Y, Shen Y, Ni Q, Chen Y, et al. Management of corona virus disease-19 (COVID-19): the Zhejiang experience. *Journal of Zhejiang University (medical science)* 2020;49(1):0.
74. Li JY, You Z, Wang Q, Zhou ZJ, Qiu Y, Luo R, et al. The epidemic of 2019 Novel-coronavirus (2019-nCoV) pneumonia and insights for emerging infectious diseases in the future. *Microbes Infect* 2020;22(2):80-5.
75. Eubank S, Eckstrand I, Lewis B, Venkatraman S, Marathe M, Barrett CL. Commentary on Ferguson, et al., "Impact of Non-pharmaceutical Interventions (NPIs) to Reduce COVID-19 Mortality and Healthcare Demand". *Bull Math Biol* 2020;82(4):52.
76. Lauer SA, Grantz KH, Bi Q, Jones FK, Zheng Q, Meredith HR, et al. The Incubation Period of Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) From Publicly Reported Confirmed Cases: Estimation and Application. *Ann Intern Med* 2020;172(9):577-82.
77. Saki M, Haseli S, Iranpour P. Oral Radiology Center as a Potential Source of COVID-19 Transmission; Points to Consider. *Acad Radiol* 2020;27(7):1047-8.
78. Alharbi A, Alharbi S, Alqaidi S. Guidelines for dental care provision during the COVID-19 pandemic. *Saudi Dent J* 2020;32(4):181-6.
79. Tan HL, Faisal M, Soo CI, Ban AY, Manap RA, Hassan TM. Dental technician pneumoconiosis mimicking pulmonary tuberculosis: a case report. *BMC Pulm Med* 2016;16(1):131.
80. Shetty M, Thulasidas N, John N, Hegde C. Microbial Analysis and Determination of Antibiotic Susceptibility of Dental Laboratory Equipments and Laboratory Attire. *Contemp Clin Dent* 2018;9(4):607-12.
81. Vázquez-Rodríguez I, Estany-Gestal A, Seoane-Romero J, Mora MJ, Varela-Centelles P, Santana-Mora U. Quality of cross-infection control in dental laboratories. A critical systematic review. *Int J Qual Health Care* 2018;30(7):496-507.
82. Rose VE. AIHA and OSHA reform. *Am Ind Hyg Assoc J* 1996;57(4):325.
83. Spagnuolo G, De Vito D, Rengo S, Tatullo M. COVID-19 Outbreak: An Overview on Dentistry. *Int J Environ Res Public Health* 2020;17(6):2094.
84. Zemouri C, de Soet H, Crielaard W, Laheij A. A scoping review on bio-aerosols in healthcare and the dental environment. *PLoS One* 2017;12(5):e0178007.
85. Harrel SK, Molinari J. Aerosols and splatter in dentistry: a brief review of the literature and infection control implications. *J Am Dent Assoc* 2004;135(4):429-37.
86. Jain M, Mathur A, Mathur A, Mukhi PU, Ahire M, Pingal C. Qualitative and quantitative analysis of bacterial aerosols in dental clinical settings: Risk exposure towards dentist, auxiliary staff, and patients. *J Family Med Prim Care* 2020;9(2):1003-8.
87. Elazhary MA, Derbyshire JB. Aerosol stability of bovine parainfluenza type 3 virus. *Can J Comp Med* 1979;43(3):295-304.
88. Marui VC, Souto MLS, Rovai ES, Romito GA, Chambrone L, Pannuti CM. Efficacy of preprocedural mouthrinses in the reduction of microorganisms in aerosol: A systematic review. *J Am Dent Assoc* 2019;150(12):1015-26.
89. Harrel SK. Airborne spread of disease--the implications for dentistry. *J Calif Dent Assoc* 2004;32(11):901-6.
90. Barnes JB, Harrel SK, Rivera-Hidalgo F. Blood contamination of the aerosols produced by in vivo use of ultrasonic scalers. *J Periodontol* 1998;69(4):434-8.
91. Mikita D, Mills SE, Dazeley SE, Gabriel ME. Tuberculosis infection in U.S. Air Force dentists. *Am J Dent* 1995;8(1):33-6.
92. Saravia SA, Raynor PC, Streifel AJ. A performance assessment of airborne infection isolation rooms. *Am J Infect Control* 2007;35(5):324-31.
93. Adams NJ, Johnson DL, Lynch RA. The effect of pressure differential and care provider movement on airborne infectious isolation room containment effectiveness. *Am J Infect Control* 2011;39(2):91-7.
94. Esccombe AR, Moore DA, Gilman RH, Navincopa M, Ticona E, Mitchell B, et al. Upper-room ultraviolet light and negative air ionization to prevent tuberculosis transmission. *PLoS Med* 2009;6(3):e43.
95. Memarzadeh F, Olmsted RN, Bartley JM. Applications of ultraviolet germicidal irradiation disinfection in health care facilities: effective adjunct, but not stand-alone technology. *Am J Infect Control* 2010;38(5 Suppl 1):S13-S24.
96. Hagbom M, Nordgren J, Nybom R, Hedlund KO, Wigzell H, Svensson L. Ionizing air affects influenza virus infectivity and prevents airborne-transmission. *Sci Rep* 2015;5:11431.
97. Knibbs LD, Morawska L, Bell SC, Grzybowski P. Room ventilation and the risk of airborne infection transmission in 3 health care settings within a large teaching hospital. *Am J Infect Control* 2011;39(10):866-72.
98. Health Quality Ontario . Portable Ultraviolet Light Surface-Disinfecting Devices for Prevention of Hospital-Acquired Infections: A Health Technology Assessment. *Ont Health Technol Assess Ser* 2018;18(1):1-73.
99. Shahidi Bonjar AH. Syringe micro vibrator (SMV) a new device being introduced in dentistry to alleviate pain and anxiety of intraoral injections, and a comparative study with a similar device. *Ann Surg Innov Res* 2011;5(1):1.
100. Wong SS, Yuen KY. The management of coronavirus infections with particular reference to SARS. *J Antimicrob Chemother* 2008;62(3):437-441.
101. Assiri A, Al-Tawfiq JA, Al-Rabeeah AA, Al-Rabiah FA, Al-Hajjar S, Al-Barak A, et al. Epidemiological, demographic, and clinical characteristics of 47 cases of Middle East respiratory syndrome coronavirus disease from Saudi Arabia: a descriptive study. *Lancet Infect Dis* 2013;13(9):752-61.
102. Nicola M, O'Neill N, Sohrabi C, Khan M, Agha M, Agha R. Evidence based management guideline for the COVID-19 pandemic - Review article. *Int J Surg* 2020;77:206-16.
103. Xu K, Cai H, Shen Y, Ni Q, Chen Y, Hu S, et al. Zhejiang Da Xue Xue Bao Yi Xue Ban 2020;49(2):147-57.
104. Singhal T. A Review of Coronavirus Disease-2019 (COVID-19). *Indian J Pediatr* 2020;87(4):281-6.
105. Mark K, Steel K, Stevenson J, Evans C, McCormick D, Willocks L, et al. Coronavirus disease (COVID-19) Community Testing

- Team in Scotland: A 14-day review, 6 to 20 February 2020. *Euro Surveill* 2020;25(12):2000217.
- 106.Fallahi HR, Keyhan SO, Zandian D, Kim SG, Cheshmi B. Being a front-line dentist during the Covid-19 pandemic: a literature review. *Maxillofac Plast Reconstr Surg* 2020;42(1):12.
- 107.Ng K, Poon BH, Kiat Puar TH, Shan Quah JL, Loh WJ, Wong YJ, et al. COVID-19 and the Risk to Health Care Workers: A Case Report. *Ann Intern Med* 2020;172(11):766-7.
- 108.Sheng WH, Ko WC, Huang YC, Hsueh PR. SARS-CoV-2 and COVID-19. *J Microbiol Immunol Infect* 2020;53(3):363-364.
- 109.Dutil S, Meriaux A, de Latremoille MC, Lazure L, Barbeau J, Duchaine C. Measurement of airborne bacteria and endotoxin generated during dental cleaning. *J Occup Environ Hyg* 2009;6(2):121-130.
- 110.Perry JL, Pearson RD, Jagger J. Infected health care workers and patient safety: a double standard. *Am J Infect Control* 2006;34(5):313-319.

Pivotal exigencies of dental services and related professions, in COVID-19 pandemic: a systematic literature review

Ghasem Janbabai M.D.,
 M.M.Sc.^{1,12,17}, Amir Hashem
 Shahidi Bonjar D.D.S., M.Sc.,
 Ph.D.^{2,3,4}, Abtin Heidarzadeh M.D.,
 M.P.H.^{5,17}, Mahdi Shadnoush
 D.D.S., M.M.Sc.^{6,12}, Ghasem
 Sadeghi D.D.S.^{12,13}, Mohsen
 Dalband D.D.S., O.M.F.S.^{7,12},
 Amir Reza Rokn D.D.S., M.Sc.^{8,12},
 Hamid Samadzadeh D.D.S.^{12,14},
 Ali Tajernia D.D.S., M.Sc.^{12,15},
 Said Sai D.D.S., M.Sc.^{12,16},
 Reza Masaeli D.D.S., Ph.D.^{9,12},
 Gholamreza Heydari D.M.D.,
 M.P.H., Ph.D.¹¹,
 Ali Yazdani D.D.S., M.Sc.^{2,12},
 Behzad Houshmand D.D.S.,
 M.Sc.^{10,11,12*}

1- Department of Hematology, School of Medicine, Mazandaran University of Medical Sciences, Sari, Iran. 2- Department of Restorative Dentistry, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 3- Institute for Future Studies in Health, Kerman University of Medical Sciences, Kerman, Iran. 4- Research Institute of Dental Sciences, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 5- Department of Community Medicine, School of Medicine, Guilan University of Medical Sciences, Rashi, Iran. 6- Department of Clinical Nutrition, School of Nutrition Science and Food Technology, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 7- Department of Oral and Maxillofacial Surgery, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 8- Department of Periodontology, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 9- Department of Dental Biomaterials, School of Dentistry, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 10- Department of Periodontology, School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran. 11- Secretariat of Undergraduate and Postgraduate Dental Board, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran. 12- Deliberative Committee of COVID-19 Dental Related Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran. 13- Office of Dental Affairs, Deputy of Treatment Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran. 14- Office of Oral and Dental Health, Deputy of Hygiene Affairs, Ministry of Health and Medical Education, Tehran, Iran. 15- Iranian Dental Association, Tehran, Iran. 16- Iranian Endodontists Association, Tehran, Iran. 17- Scientific Committee of National Headquarters for COVID-19 Administration, Tehran, Iran.

* Corresponding author: School of Dentistry, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran.
 Tel: +98-21-22403080
 E-mail: behzad.houshmand.3990@gmail.com

Abstract

Received: 26 Oct. 2020 Revised: 02 Nov. 2020 Accepted: 12 Apr. 2021 Available online: 21 Apr. 2021

Background: The advent of Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 (so-called SARS-CoV-2) causing Coronavirus Disease 2019 (so-called COVID-19) occurred in Dec. 2019 in Wuhan, China. Having an inconceivable worldwide contagion, the outbreak was labeled a pandemic by the WHO. Dental services and related professions (including dentists, dental assistants, dental hygienists and the personnel of cleansing, remedial, triage, dental laboratories, radiographic laboratories and other related paraclinicals), facing galore aerosol and droplets, are in the topmost risk groups exposed to the queer virus. This study was fulfilled to round up evidence-based data to break a link at any part of the virus transmission chain in dental services and related professions.

Methods: Relevant online databases, as PubMed, MEDLINE, Embase, Scopus, Google Scholar and TripDatabase were searched meticulously and evaluated for relevant published original research papers. Subsequently, to fulfill the investigation, ADA, CDC and WHO websites were reviewed to gain relevant guidelines and protocols. Consequently, 476 resources were included considering the canonical inclusion criteria. For the sake of quality assessment of the resources, an authentic checklist was exploited to score the resources from 1 to 15, wherein the admissible score was 10. After deliberation of resources, 366 of them were excluded and finally, 110 resources were selected and overhauled to attain a comprehensive perception on the subject of the investigation.

Results: Transmission of SARS-CoV-2 includes direct transmission (via droplet and aerosol inhalation) and indirect transmission (via surface and instrument contamination), which can amply occur in dental services and related professions. Therefore, an all-inclusive evidence-based miscellany was rallied on several exigent topics, containing genuine esteem in reputable scientific authorities, to present a consummate report for the dental clinicians and related practitioners, working in the course of the running pandemic.

Conclusion: Contemplating the ongoing crisis, undertaking a set of miscellany elected guidelines and protocols, is indispensable in this vital interval of history to bridle the current pandemic, which has been abridged via this systematic perusal.

Keywords: COVID19, SARS-CoV-2, aerosol, dentistry, professional-patient transmission, coronavirus, coronavirus infection.